MAYLEN ®.
SEGUIMIENTO VARIETAL
EVALUACIONES 2012 - 2019

Viticultura & Fruticultura Asociados

Felipe Bonelli – Dragomir Ljubetic

ANDES NEW VARIETIES ADMINISTRATION
A.N.A.
Your partner for South America

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

Viticultura & Fruticultura Asociados

MAYLEN®		
DESCRIPCIÓN GENERAL	COLOR	Negra (Negra Azulina)
	FECHA DE COSECHA	Media estación. TH + (10 a 16 días)
	FORMA DE RACIMO	Cónico - Tubular
	FORMA DE BAYA	Esférica
	SEMILLADA	No. Puede presentar rudimento blando
	SABOR	Sobresaliente. Alta relación azúcar/acidez.
DATOS PRODUCTIVOS	FERTILIDAD	Media - Alta
	PESO DE RACIMO	500 – 700 g
	INDICE DE COSECHA RECOM.	**20 -21 °Brix , Acidez 0,7 %, Relación azúcar / acidez > 35**
	COLOR	No presenta problemas en la toma de color llegando a 100% cubr.
	VIGOR	Medio. Se recomienda el uso de portainjertos para potenciar su producción
	POSTCOSECHA	**Muy buena. 60 días sin problemas. Buena condición de escobajo**

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

Viticultura & Fruticultura Asociados

MAYLEN®		
DESCRIPCIÓN GENERAL	COLOR	Negra (Negra Azulina)
	FECHA DE COSECHA	Media estación. TH + (10 a 16 días)
	FORMA DE RACIMO	Cónico - Tubular
	FORMA DE BAYA	Esférica
	SEMILLADA	No. Puede presentar rudimento blando
	SABOR	Sobresaliente. Alta relación azúcar/acidez.
DATOS PRODUCTIVOS	FERTILIDAD	Media - Alta
	PESO DE RACIMO	500 – 700 g
	INDICE DE COSECHA RECOM.	**20 -21 °Brix , Acidez 0,7 %, Relación azúcar / acidez > 35**
	COLOR	No presenta problemas en la toma de color llegando a 100% cubr.
	VIGOR	Medio. Se recomienda el uso de portainjertos para potenciar su producción
	POSTCOSECHA	**Muy buena. 60 días sin problemas. Buena condición de escobajo**

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

Calendario de cosecha

Viticultura & Fruticultura Asociados



©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

2 GUÍA DE MANEJOS

Viticultura & Fruticultura Asociados

Descriptor	Poda	Manejos Pre-flor	Raleo(Ga3)	Crecimiento (Ga3)	Arreglo de racimos	Calibre
V&F Asoc. 2012 / 13	5 – 7 yemas	Eliminar 2° racimo del brote. Ajuste de carga Algas marinas (brote de 30 y 60 cm)	2 x 10 ppm Inicio de caliptras partidas y 80% flor. Resultado: 2 bayas/ cm/lineal	2 x 30 ppm 19-22mm	Descole a 18 cm. 4-5 (3) entresaque 90 – 110 bayas / rac.	19 - 22
V&F Asoc. 2013 / 14	Poda a cargadores de 5-7 yemas	Eliminar 2° racimo del brote. Ajuste de carga Algas marinas (brote de 30 y 60 cm de largo)	2 x 10 ppm Inicio de caliptras partidas Y 80% flor 2,5 a 3,5 bayas/cm lineal	2 x 30 ppm 20-23 mm 3 x 30 ppm 20-22 mm (> influen. Portainjertos)	Descole a 16-18 cm, 4-5 (3) entresaque en francas 70-90 bayas/racimo	19 -22
V&F Asoc. 2014 / 15	5 – 7 yemas	Eliminar segundo racimo del brote. Ajuste de carga Algas marinas con brote de 30 y 60 cm de largo	2 x 10 ppm Inicio de caliptras partidas , 80% flor (2,3 bayas / cm lineal) 3 x 10 ppm Inicio de calip., 30 y 80% flor (2,1 bayas/cm)	2 x 30 ppm 19-22mm	Descole a 18 cm, 4-5 (3) entresaque 90-100 bayas/racimo	19 - 22
V&F Asoc. 2015 / 16	5 – 7 yemas	Eliminar segundo racimo del brote. Ajuste de carga Algas marinas con brote de 30 y 60 cm de largo	3 x 10 ppm Inicio de calip., 30 y 80% flor (3,4 bayas/cm)	2 x 30 ppm 19-20 mm	Descole a 18 cm, 4-5 (3) entresaque 100-120 bayas/racimo	19-20
V&F Asoc. 2016 / 17	5 – 7 yemas	Eliminar segundo racimo del brote. Ajuste de carga Algas marinas con brote de 30 y 60 cm	3 x 10 ppm Inicio de calip., 30 y 80% flor (2,3 bayas/cm)	2 x 30 ppm 21-23 mm	Descole a 18 cm, 4-5 (3) entresaque 91,4 bayas/racimo	21-23
V&F Asoc. 2017 / 18	5 – 7 yemas	Eliminar segundo racimo del brote. Ajuste de carga Algas marinas con brote de 30 y 60 cm de largo	3 x 10 ppm Inicio de calip., 30 y 80% flor (2,3 bayas/cm)	3 x 30 ppm (20-22 mm) 3 x 30 ppm + anill (21-23) 1 x 30 ppm + anill (21-23)	Descole a 18 cm, 3 (3) entresaque 83 bayas/racimo	21-23
V&F Asoc. 2018 / 19	3 yemas	Eliminar segundo racimo del brote. Ajuste de carga Algas marinas con brote de 30 y 60 cm de largo	3 x 10 ppm Inicio de calip., 30 y 80% flor (2,0 bayas/cm)	3 x 30 ppm (21-23)	Descole a 186cm, 3 (3) entresaque 90 bayas/racimo	>23

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

3 MANEJOS

Viticultura & Fruticultura Asociados

Objetivos:
- >3.500 cajas/ha
- Racimos > 600 g
- Mantener Vigor

Uso de AG3 no genera problemas
Mejorar raleo natural
Aumentar crocancia

Diseño de huerto: Marco de plantación
Elección del patrón
Cond. edafoclimáticas
Diseño agronómico (prep.suelo, sist. Riego)

	POSTCOSECHA	PODA	BROTACIÓN			RALEO			CREC		
Manejo cultural	Reducción del riego. Fertilización	5-7 Yemas	Desbrota	Eliminar brotes indeseados		Buscar 2 bayas/cm lineal			Ilumin. ANILLADO	Ilumin.	Ilumin.
Reg. Crecimiento	Citoquininas Etileno		TDZ 2x1g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha
Nutrición foliar			CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	Urea (600g/100l)	Urea (600g/100l)	Urea (600g/100l)			
Observaciones	<1 MES marzo	45-60% Fertilidad	Punta verde Estado de piña	10 cm de raquis		Caliptra partida	20-30% de flor	80-90% de flor	Fin shatter	4 días d.	12 mm baya?

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

3 MANEJOS

Viticultura & Fruticultura Asociados

Objetivos:
- >3.500 cajas/ha
- Racimos > 600 g
- Mantener Vigor

Mejorar raleo natural
(Uso de AG3 no genera problemas)

Aumentar crocancia

Diseño de huerto: Marco de plantación
Elección del patrón
Cond. edafoclimáticas
Diseño agronómico (prep.suelo, sist. Riego)

	POSTCOSECHA	*PODA*	*BROTACIÓN*			*RALEO*			*CREC*		
Manejo cultural	Reducción del riego. Fertilización	**5-7 Yemas**	**Desbrota**	**Eliminar brotes indeseados**		**Buscar 2 bayas/cm lineal**			Ilumin. ANILLADO	Ilumin.	Ilumin.
Reg. Crecimiento	Citoquininas Etileno		TDZ 2x1g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha
Nutrición foliar			CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	Urea (600g/100l)	Urea (600g/100l)	Urea (600g/100l)			
Observaciones	<1 MES marzo	**45-60% Fertilidad**	Punta verde Estado de piña	10 cm de raquis		Caliptra partida	20-30% de flor	80-90% de flor	Fin shatter	4 días d.	12 mm baya?

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

Viticultura & Fruticultura Asociados

Casos exitosos:
Formación en H
Poda a 3 yemas

Agrícola Siegel S.a.

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

3 MANEJOS

Viticultura & Fruticultura Asociados

Objetivos:
- >3.500 cajas/ha
- Racimos > 600 g
- Mantener Vigor

Mejorar raleo natural
(Uso de AG3 no genera problemas)

Aumentar crocancia

Diseño de huerto: Marco de plantación
Elección del patrón
Cond. edafoclimáticas
Diseño agronómico (prep.suelo, sist. Riego)

	POSTCOSECHA	*PODA*	*BROTACIÓN*			*RALEO*			*CREC*		
Manejo cultural	Reducción del riego. Fertilización	**5-7 Yemas**	**Desbrota**	**Eliminar brotes indeseados**		**Buscar 2 bayas/cm lineal**			Ilumin. ANILLADO	Ilumin.	Ilumin.
Reg. Crecimiento	Citoquininas Etileno		TDZ 2x1g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha
Nutrición foliar			CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	Urea (600g/100l)	Urea (600g/100l)	Urea (600g/100l)			
Observaciones	<1 MES marzo	**45-60% Fertilidad**	Punta verde Estado de piña	10 cm de raquis		Caliptra partida	20-30% de flor	80-90% de flor	Fin shatter	4 días d.	12 mm baya?

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

3 MANEJOS

Viticultura & Fruticultura Asociados

Objetivos:
- >3.500 cajas/ha
- Racimos > 600 g
- Mantener Vigor

Mejorar raleo natural
(Uso de AG3 no genera problemas)

Aumentar crocancia

Diseño de huerto: Marco de plantación
Elección del patrón
Cond. edafoclimáticas
Diseño agronómico (prep.suelo, sist. Riego)

	POSTCOSECHA	*PODA*	*BROTACIÓN*			*RALEO*			*CREC*		
Manejo cultural	Reducción del riego. Fertilización	**5-7 Yemas**	**Desbrota**	**Eliminar brotes indeseados**		**Buscar 2 bayas/cm lineal**			Ilumin. ANILLADO	Ilumin.	Ilumin.
Reg. Crecimiento	Citoquininas Etileno		TDZ 2x1g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Bioestim.	**Ag3 10g.i.a/ha** Bioestim.	**Ag3 10g.i.a/ha** Bioestim.	**Ag3 10g.i.a/ha** Bioestim.	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha
Nutrición foliar			CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	Urea (600g/100l)	Urea (600g/100l)	Urea (600g/100l)			
Observaciones	<1 MES marzo	**45-60% Fertilidad**	Punta verde Estado de piña	10 cm de raquis		**Caliptra partida**	**20-30% de flor**	**80-90% de flor**	Fin shatter	4 días d.	12 mm baya?

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

3 MANEJOS

Viticultura & Fruticultura Asociados

Objetivos:
- >3.500 cajas/ha
- Racimos > 600 g
- Mantener Vigor

Mejorar raleo natural
(Uso de AG3 no genera problemas)

Aumentar crocancia

Diseño de huerto: Marco de plantación
Elección del patrón
Cond. edafoclimáticas
Diseño agronómico (prep.suelo, sist. Riego)

	POSTCOSECHA	*PODA*	*BROTACIÓN*			*RALEO*			*CREC*		
Manejo cultural	Reducción del riego. Fertilización	**5-7 Yemas**	**Desbrota**	**Eliminar brotes indeseados**		**Buscar 2 bayas/cm lineal**			Ilumin. ANILLADO	Ilumin.	Ilumin.
Reg. Crecimiento	Citoquininas Etileno		**TDZ 2x1g.i.a/ha** Bioestim.	**Ag3 10g.i.a/ha** Bioestim.	Bioestim.	**Ag3 10g.i.a/ha** Bioestim.	**Ag3 10g.i.a/ha** Bioestim.	**Ag3 10g.i.a/ha** Bioestim.	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha
Nutrición foliar			CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	**Urea (600g/100l)**	**Urea (600g/100l)**	**Urea (600g/100l)**			
Observaciones	<1 MES marzo	**45-60% Fertilidad**	**Punta verde Estado de piña**	**10 cm de raquis**		**Caliptra partida**	**20-30% de flor**	**80-90% de flor**	Fin shatter	4 días d.	12 mm baya?

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

3 MANEJOS

Viticultura & Fruticultura Asociados

Objetivos:
- >3.500 cajas/ha
- Racimos > 600 g
- Mantener Vigor

Mejorar raleo natural
(Uso de AG3 no genera problemas)

Aumentar crocancia

Diseño de huerto: Marco de plantación
- Elección del patrón
- Cond. edafoclimáticas
- Diseño agronómico (prep.suelo, sist. Riego)

	POSTCOSECHA	*PODA*	*BROTACIÓN*			*RALEO*			*CREC*		
Manejo cultural	Reducción del riego. Fertilización	5-7 Yemas	Desbrota	Eliminar brotes indeseados		Buscar 2 bayas/cm lineal			Ilumin. ANILLADO	Ilumin.	Ilumin.
Reg. Crecimiento	Citoquininas Etileno		TDZ 2x1g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Bioestim	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha
Nutrición foliar			CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	Urea (600g/100l)	Urea (600g/100l)	Urea (600g/100l)			
Observaciones	<1 MES marzo	45-60% Fertilidad	Punta verde Estado de piña	10 cm de raquis		Caliptra partida	20-30% de flor	80-90% de flor	Fin shatter	4 días d.	12 mm baya?

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

Viticultura & Fruticultura Asociados

Brotación

Puntas verdes	Estado de piña	Raquis 10 cm de largo	Raleo flor	Resultado
2 g.i.a. / ha de TDZ	2 g.i.a. / ha de TDZ	10 g.i.a./ha Ag3	3x10g.i.a/ha	3,3 bayas/cm
2 g.i.a. / ha de TDZ	2 g.i.a. / ha de TDZ	---	3x10g.i.a/ha	3,5 bayas/cm

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

3 MANEJOS

Viticultura & Fruticultura Asociados

Objetivos:
- >3.500 cajas/ha
- Racimos > 600 g
- Mantener Vigor

Mejorar raleo natural
(Uso de AG3 no genera problemas)

Aumentar crocancia

Diseño de huerto: Marco de plantación
- Elección del patrón
- Cond. edafoclimáticas
- Diseño agronómico (prep.suelo, sist. Riego)

	POSTCOSECHA	*PODA*	*BROTACIÓN*			*RALEO*			*CREC*		
Manejo cultural	Reducción del riego. Fertilización	5-7 Yemas	Desbrota	Eliminar brotes indeseados		Buscar 2 bayas/cm lineal			Ilumin. ANILLADO	Ilumin.	Ilumin.
Reg. Crecimiento	Citoquininas Etileno		TDZ 2x1g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Bioestim	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha
Nutrición foliar			CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	Urea (600g/100l)	Urea (600g/100l)	Urea (600g/100l)			
Observaciones	<1 MES marzo	45-60% Fertilidad	Punta verde Estado de piña	10 cm de raquis		Caliptra partida	20-30% de flor	80-90% de flor	Fin shatter	4 días d.	12 mm baya?

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

3 MANEJOS

Viticultura & Fruticultura Asociados

Objetivos:
>3.500 cajas/ha
Racimos > 600 g
Mantener Vigor

Mejorar raleo natural
(Uso de AG3 no genera problemas)

Aumentar crocancia

Diseño de huerto: Marco de plantación
Elección del patrón
Cond. edafoclimáticas
Diseño agronómico (prep.suelo, sist. Riego)

	POSTCOSECHA	*PODA*	*BROTACIÓN*			*RALEO*			*CREC*		
Manejo cultural	Reducción del riego. Fertilización	5-7 Yemas	Desbrota	Eliminar brotes indeseados		Buscar 2 bayas/cm lineal			Ilumin. ANILLADO	Ilumin.	Ilumin.
Reg. Crecimiento	Citoquininas Etileno		TDZ 2x1g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Bioestim	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 10g.i.a/ha Bioestim.	Ag3 60g.i.a/ha Bioestim	Ag3 60gi.a/ha Bioestim	Ag3 60g.i.a/ha
Nutrición foliar			CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	CORON (5 lt/ha)	Urea (600g/100l)	Urea (600g/100l)	Urea (600g/100l)			
Observaciones	<1 MES marzo	45-60% Fertilidad	Punta verde Estado de piña	10 cm de raquis		Caliptra partida	20-30% de flor	80-90% de flor	Fin shatter	4 días d.	12 mm baya?

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

3 MANEJOS

Viticultura & Fruticultura Asociados

Objetivos:
>3.500 cajas/ha
Racimos > 600 g
Mantener Vigor

Mejorar raleo natural
(Uso de AG3 no genera problemas)

Aumentar crocancia

Diseño de huerto: Marco de plantación
Elección del patrón
Cond. edafoclimáticas
Diseño agronómico (prep.suelo, sist. Riego)

	ARREG.RACIMOS	*AJUSTE DE CARGA*	*PINTA*	*COSECHA*
Manejo cultural	80 a 90 bayas Eliminar hombros superiores Cintura (3 hombros) Descolar a 16 cm *entresaque sólo en los racimos que la requieran	30 Ton/ha 3.000 a 3.500 Cj/ha 40.000 a 45.000 / ha	ILUMINACIÓN (Aumentar crocancia)	21°Brix 0,7 % acidez Full color
Reg. Crecimiento			Bioestimulante	
Nutrición foliar				

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

Viticultura & Fruticultura Asociados

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

PREVIO ARREGLO DE RACIMO

POST ARREGLO DE RACIMO

Uniformidad de calibre.
Porcentaje de bayas del racimo según su diámetro

Viticultura & Fruticultura Asociados

PLANTAS INJERTADAS. 22 DE FEBRERO 2018.



AJUSTE DE CARGA (N° RACIMOS POST-ARREGLO)	*TRATAMIENTO*	*PESO PROMEDIO DE RACIMOS (g)*	*CALIBRE PROMEDIO (mm)*
35,0	1 x 30 ppm + anillado	674,9	21 a 23
	3 x 30 ppm	616,1	20 a 21
	3 x 30 ppm + anillado	669,9	21 a 23

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

Uniformidad de calibre.
Porcentaje de bayas del racimo según su diámetro

PLANTAS INJERTADAS. 22 DE FEBRERO 2018.









©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

Viticultura & Fruticultura Asociados

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

Relación azúcar / acidez

TEMPORADA	FECHA DE COSECHA	BRIX DE LABORATORIO	ACIDEZ
2013/14	Febr 17 – 22	21 - 22	0,6 – 0,8
2014/15	Febr 27	21 – 22	0,4 – 0,5
2015/16	Mar 2	21 - 22	0,6 – 0,7
2016/17	Feb 6	19 -20	0,4 – 0,6
2017/18	Feb 22	21-22	0,9 – 1,0
2018/19	Mar 18 San Fernando	23	0,6

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

Viticultura & Fruticultura Asociados

Portainjerto	COLOR (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19)	
	AUREOLA VERDE (SI/NO)	CUBRIMIENTO (%)
Franco		
Ramsey		
Paulsen	NO	100
Freedom		
Harmony		

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

Viticultura & Fruticultura Asociados

P.I.	RACIMO				SEMILLAS/BAYA			DESGRANE
	TAMAÑO	FORMA	PALUDO	FORMA BAYAS	TRAZA	RUDIMENTO	SEMILLA	
FRANCO	MEDIANO							
RAMSEY	MEDIANO GRANDE							
PAULSEN	MEDIANO - GRANDE	CÓNICO	NO	ESFERICA - OVOIDE	SI	PEQUEÑO	NO	0,1 – 0,3 %
FREEDOM	MEDIANO							
HARMONY	MEDIANO							

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

Viticultura & Fruticultura Asociados

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

MAYLEN ®., luego de 60 días de guarda en frío + 1 día a temp. ambiente

FRIO

FUMIGADA

Viticultura & Fruticultura Asociados

MAYLEN ®., luego de 60 días de guarda en frío + 1 día a temp. ambiente

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

FRIO

FUMIGADA

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.

Los manejos recomendados son el resultados de 9 años de seguimiento y evaluaciones de la variedad en Chile en las Regiones Metropolitana, Quinta y Cuarta.

Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones

CONTACTO

Felipe Bonelli

F.bonelli.iglesias@gmail.com

(+56 9) 87683790

Viticultura & Fruticultura Asociados

©ANA Chile, 2019. La información y material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de carácter estrictamente evaluativo y no comercial. El acceso a este material es restringido, pudiendo su divulgación no autorizada por ANA traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción y comunicación.