

Sweet Aryana[®]

PA1UNIBO cv.

Debemos prevenir:

- ① Cosecha anticipada, que lleve a tener fruta con mayor acidez.
- ② Disminución de °Brix y calibre, por sobrecarga de los árboles.
- ③ Disminución de firmeza y °Brix por uso de plásticos después de color pajizo.

Consideraciones para definir la carga frutal

-  Precocidad media de entrada en producción.
-  Buen porcentaje de cuaja en huertos adultos (año sin falta horas frío, primavera normal).
En Gisela[®] y Maxma: 25-30%
En Colt: 15-20%
-  Altamente vigorosa.
-  Potencial de calibre grande: 11 g promedio.

Para obtener fruta de calidad, se recomiendan cargas máximas para huertos adultos:

En un rango entre 12.000 – 14.000 kg/ha según la densidad de plantación y portainjerto.

Sweet Aryana

PA1UNIB0 cv.

Sugerencias de manejo
huerto adulto



Poda de producción: 150 a 250 dardos

La intensidad de la poda y número de dardos frutales a dejar por árbol depende de la combinación variedad/portainjerto, densidad de plantación, calidad de los dardos, acumulación de frío, probabilidad de heladas y la carga frutal del año anterior, entre otras.



Raleo de flores: eliminación del 30% al 50% de las flores

Importante considerar en casos que no se hizo raleo de yemas y/o la poda fue insuficiente. Práctica NO aconsejable en años de primavera con condiciones climáticas adversas para polinización y vuelo de abejas.



Raleo de frutos: objetivo 3 - 4 frutos /dardo

De ser necesario desarmar montones, dejar espacio entre frutos y mejorar relación general hoja / fruto en la rama (3-4 hojas/fruto).

Sweet Aryana PA1UNIBO cv.

Parámetros de calidad
esperados en la fruta



¿Cuándo cosechar Sweet Aryana[®] PA1UNIBO cv.?

El criterio para cosechar es el COLOR* y los °BRIX.



Color*

Cosecha óptima: no antes de color 3,5.



Envíos en barco

Un mínimo de 19°Brix para envíos en barco.



Envíos aéreos

Un mínimo de 21°Brix para envíos aéreos.



No recomendamos el uso de plásticos más allá de color pajizo.

Efectos negativos del uso de plásticos permanentes hasta cosecha:

- Disminución de °Brix
- Disminución de Firmeza

*Según Tabla de color y calibre de cerezas UC, 2023 (Laboratorio de Poscosecha.
Depto. de Fruticultura y Enología. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Los parámetros de cosecha
entregados en este documento
NO consideran el uso de techos ni
túneles más allá de color pajizo.